

魏氏家藏方

魏氏家藏方卷第九

疳渴

水葫蘆圓治渴生津液

百藥煎

參兩

白梅肉

研成膏搜入衆藥

烏梅肉

乾葛

訶子

肉炮取

甘草

壹兩半炙

榆柑子

紫蘇子

微炒

麥門冬

去心各半兩

人參

各壹兩去蘆

右爲細末用、好黃蠟鎔去滓將上件藥末火上和圓如櫻桃大每服壹圓含化

清中圓治渴有奇功

宣連

不以多少到以好酒浸過壹指許約壹伏時灑出焙乾

右為細末用醋糊為圓如梧桐子大熟湯下參伍拾圓不拘時候

清心圓治消渴

蜜陀僧

兩貳

黃連

壹兩

右為細末湯泡蒸餅為圓如梧桐子大濃煎茄根空罌湯下伍圓至拾圓止臨卧覺

惡心住服

滋渴湯

趙顯學傳

綿黃芪生壹兩

人參去藍

乾生薑

麥門冬去心

烏梅肉

甘草各半兩炙

右切成片子、每服壹兩、用水兩碗煎壹碗許、纔遇渴時、暖壹半、以壹半冷者和之、作熟水飲、若脾泄人加草菓半兩、

加料樂令黃芪湯

用局仿樂令黃耆湯合下壹料、如方煎服、只用多枳枸棘、本草云、大治上焦熱、根葉花枝皆可用、每斤縛作壹小把、用木壹碗煎取壹半、却用

煎下、攪轉汁、煎上件藥、婦人只煎當歸、建中湯、下亦得、

竹龍散治渴大効、

五靈脂

研別

黑豆

生去皮

右等分、爲細末、每服貳錢、冬瓜煎湯調下、瓜葉子皆可、壹日兩服、小渴者只壹服、瘧渴止之後、宜服八味圓、仍以五味子代附子、沈存中載於靈苑方、得效者甚多、頃同官有渴者、飲水無數、日食蔗貳拾條、與之兩服、遂不飲水、不食蔗矣、解渴飲子、生津液、除煩燥、止渴、

人參去蘆

麥門冬去心

枇杷葉刷去毛

甘草壹兩

生薑各半

綿黃芪蜜炙

乾葛有粉

生木瓜去皮各

烏梅肉

右件細剉、用水約斗餘、銀石鍋內煮、俟拾沸、候欲飲時、溫半盞許、自在飲之、須食後服、

吐血

蒲黃散治卒吐血不止、

用蒲黃壹錢、煎湯調下服之立止、

靈脂散治吐血不止、

用吊藤半兩、沒藥半兩、五靈脂壹兩、搗羅爲末、  
每服壹錢、溫酒調下、不拘時候、

又方、治吐血至壹斗者、

大小蘄不拘多少、生研取濃汁、調白及末貳錢、  
不過參服止、

又方

糯米貳合、洗淨煮粥、入阿膠壹片、小者貳片、生  
薑少許、待溫、入人參末半錢、攪和服、不拘時候、

又方

甘草參兩、白朮貳兩、生用、同搗細作壹服、以酒壹勝、童子小僂半勝、壹處煎至壹大盞、放溫徐徐服盡、

又方

藕節

拾箇

青薄苛

如無乾者亦得

生地黃

無生者則用生乾地黃代之

右等分、砂盆內研取汁壹盞、分作兩服、併喫貳服、如未止、再依前作貳服、

又方

熟艾三雞子大、水參盞、煮壹盞、頓服、



又方

燈心燈上燒灰爲末、溫水調下壹盞、食後服、  
治咯血

側柏葉伍兩、水伍盞、煎至參盞、分作參服、  
六乙散治咯血發寒熱

黃耆陸兩

甘草壹兩

右爲細末、如常點服、不拘早晚、乾喫亦得、

血妄行

應聖圓、調榮衛、斂血歸氣、專止大崩、失血神效、  
阿膠蛤粉炒  
熟乾地黃洗

黃耆酒蒸各

木賊存性

五倍子燒存

梭櫚性煨存

艾葉

雞冠花燒存性

右為細末、煉蜜和圓、如梧桐子大、每服肆拾圓、

空心來湯下、

地榆寸剉

槐花炒

卷柏炒

蒲黃隔紙炒

人參去蘆

赤石脂煨分

桐子大、每服肆拾圓、

黑聖散治吐血過多、傷酒食飽、低頭掬損、嘔血不止、并血妄行、口鼻中俱出、但聲未失者、投之無不

見效

○百華霜

不拘多少、研羅爲細末、吐血、便血、用糯米飲調下、壹貳錢立效、鼻衄、搗壹字入鼻中、立差、皮肉破處、及灸瘡出血、百般用藥不止者、搽半錢、或壹字立止、

順氣散、順血、今有所歸、

四物湯、如法煎、調真蒲黃末貳錢、不拘時候服、如上膈虛熱壅滿、更煎蘇子降氣湯服之、

固經散、治鼻海膿血者、

夜明螺

亦名蚶螺、殼大、編者火煨存性、

右爲細末、用貳錢降真末半錢同和、臨時用腦麝些小、以紙撚點藥入鼻中、每壹番用紙撚壹番換藥、壹日參次、仍間服金沸草散、

又方

皂角刺紫嫩者、以白瓷器鋒刮下、不得用鐵器、但取刺尖處皮兩寸許、不見火懷乾、不拘多少、以多爲上、但揀紫皮刮淨、秤作貳兩、磨成末、用乳香壹兩、麝香腦子各用少許、同爲細末、用無灰酒調下、每服貳錢許、食後服、日進參服、與前方相間用之、

止血散治鼻中膿血、非衄血、  
千葉石榴花爲細末、吹鼻中、立愈、

又方

用葱連白炒、貼腳心、及將朴消與生地黃研細、  
用紙貼腳腕、立止、

治血妄行吐血

熟乾地黃洗去土、焙乾爲細末、用好真京墨、新  
汲水磨半盞許、分作貳服、調地黃末服之、

鼻衄

神効散

用白及壹味、爲細末、雪水調令稀稠得所、塗遍鼻上、頻用雪塊熨藥上、無雪只用冷水掃、仍用掠頭子、於髮際緊繫如婦人無掠頭子、止用頭鬚相接亦得其效如神、

又方

香白芷

太平州者尤佳

右爲細末、用茅花煎湯下、無花取根用、

又方

用紙燃蘸清麻油、於鼻中搗之數遍、

又方

用黑錫丹、以棗湯仕下、面青身冷、虛弱人、方可服、須子細用之、

水腫

通氣圖、治脾腎氣虛、腎水流溢、四肢作腫、面目虛浮、腰脚腫脹、遊走不定、小便赤澀、大便秘結、脹滿氣痞、脚膝無力、食少倦怠、漸成水證、

附子

大者壹隻生去皮

大蒜頭

伍枚剝去皮

赤小豆

揀淨伍兩

已上參味同於砂鍋內用水伍勝慢火

煮乾為度、先用水參勝煮、漸添至伍勝

只取附子焙乾為末、餘藥不用、

白花商陸根

兩

南木香

沈香

貳錢不  
見火

車前子

右同附子為細末、用薏苡仁末、水煮作糊為圓、  
如梧桐子大、每服肆伍拾圓、薏苡仁煎湯下、空  
心食前日進參兩服、病甚者日進伍服、不妨其  
效如神、

餘糧  
浮腫、

白朮圓、專治男子婦人氣血虛損、頭面四肢

白朮

炒

木香

濕紙  
裹煨



白豆蔻

新裹煨

茴香

淘去沙炒

肉桂

去麝皮不見火

川芎

青皮

去穢

白茯苓

去皮

蓬莪朮

炮

蛇含石

火煨別研

禹餘糧

石火煨別研

鐵砂

伍兩火煨別研

乾薑

炮洗

白蒺藜

刺去

京三稜

炮

附子

炮去皮臍

牛膝

去蘆酒浸

羌活

當歸

去蘆洗淨酒浸焙乾各半兩

參兩別研

燀

燀

燀

燀

燀

燀

燀

燀

右爲細末、水泡蒸餅作糊、攪和、杵什餘下、圓如  
梧桐子大、每服伍拾圓、溫酒下、白湯亦得、空心  
食前服、

橘薑圓治腫脹、此藥不瀉、不利、小便、只泄氣、自退、  
須服半月日間、方見功效、

蓬莖朮炮

生薑

青橘皮

去穢

右等分、用好醋煮令爛、只取青皮壹味爲末、煮  
粟米粥爲圓、如梧桐子大、每服伍拾圓、食前淡  
薑湯吞下、茶酒亦得、

內消圓、通水道、

焰消壹兩

號丹壹字

胡椒肆拾粒

右為細末、飯為圓、如梧桐子大、每服拾伍圓、至貳拾圓止、用滑石木通煎湯送下、欲使之通水道也、

狼毒圓、治腹脹水腫等疾、

雄黃生

肉桂去麤皮不

漢椒去目炒

狼毒

大附子炮去

乾漆炒煙

甘遂

生用各壹兩貳錢

芫花

炒醋

檳榔

生用各壹兩半

桃仁

炒連皮

厚朴

去皮薑製

枳殼

生去穰

鼈甲

炙

右為細末、煉蜜為圓、如梧

桐子

大每服拾圓溫

銀州

柴胡生用各壹兩肆錢

犀角

生用各壹兩

乾薑

炮洗

萊菔

生

大戟

生

川大黃

生

當歸

生用各壹兩

椒巴圓治十種水氣

湯下

胡椒貳佰粒

巴豆拾粒、去皮膜、心、用、紙、油、盡、為、度、

右為細末、醋煮麪糊為圓、如菜豆大、每服壹圓、

食後淡薑湯下、實者貳服、虛者壹服、以小便頻

數為效、壹兩日不妨、忌食鹽物淹藏之類、大忌

濕麪、

沈香散療脹滿喘急、眠睡不得、

沈香不見火

木香不見火

枳殼貳炒、去穢、各半兩

蘿蔔子壹兩炒

右為咬咀、每服貳錢水壹盞半、生薑伍片煎、

分去滓服不拘時候  
羌活散治一切腹脹急

羌活

蘿蔔子

右各壹兩剉同炒香爲麤末分作參服每服水  
貳盞入藿香葉大蒜參莖切碎同煎捌分去  
滓腹空時連進參服以泄氣爲度後服半硫圓  
調補更合硫黃黑錫藥常服以壓虛氣所以不  
用黑錫丹爲有導氣藥故也  
快氣消塊散去積除痞癖氣塊腫硬疼痛噎塞服  
之立效

陳皮

炒去白

京三棧

長壹宿

石菖蒲

節密

益智

大者剪破尖用麥麩炒令黃色去麩各壹兩

北細辛

真者去葉土壹兩淨

蓬莪朮

炮

青木香

吳茱萸

湯泡柒次炒各參錢

右為細末每服貳大錢水壹盞半煎至捌分空

心溫服日進參服

治水氣

綠豆

合參

商陸

半斤

右同煮候豆熟為度只喫豆盡從小便出此方

甚妙不拘時候

淋瀝

小便閉澀

藊灰散治淋如神

藊葉

壹兩燒存性

滑石

半兩別研

右為細末入麻油數點臘茶湯調下不拘時候

瞿麥散治心臟積熱小便赤澀及一切五淋沙石旋血痛不可忍

瞿麥

葵子

滑石

別研

木通

去皮

防風

去蘆

夏枯草



生乾地黄

細剉熟炒各壹兩

甘草

炙兩

右爲散子、每服貳錢、水壹盞、用燈心壹小束、葱參寸、同煎陸分、不計時候溫服、甚者不過參服、又方、治小便淋瀝、小腹脹痛、

滑石末壹兩、用斑猫拾肆枚、去頭足翅、同滑石炒去斑猫、平用、將滑石不用、生葱研汁、圓如梧桐子大、每服柒圓、用麝香湯送下、空心食前服、木通散、治脚氣、服補藥太多、林閉腹脹、

當歸

去蘆

槐子仁

芍藥

甘草

炙或生用亦得

赤茯苓皮去

木通皮去

右等分爲散子、每服參錢水壹大盞煎至柒分、去滓、不拘時候服、

治冷淋

乳香、肉白石、研細、溫酒下、食前服、

小便閉澀

真琥珀、不拘多少、爲細末、燈心棗湯下、食前服、  
八味圓、見局方、老人及虛弱人、小便不通、當服

八味圓之屬、不宜服涼心經疎導之藥、暑月多  
誤以爲伏熱、尤宜詳審、

積滯

軟紅圓

每用巴豆米粒、以黃連參塊、如巴豆大、同煮壹沸、去黃連、取出巴豆、去殼、剝去心膜、用紙裹於瓦上、捍去油、拾分、淨成霜、用號丹壹錢、先將巴豆在乳鉢內、旋入些小號丹、同巴豆研細、方入盡號丹、再研、須研令極細、如粉、不爾藥不均、恐服時緊慢無準也、然後以黃蠟如母指大者壹塊、稍多不妨、先就茶盞內、鎔開、撥去黑滓、令淨、方以研了巴豆號丹、旋入攪和、火上再煮、頻攪。

令均候黃丹微赤色取出捻作錠子收起旋圓  
如菜豆大每服壹粒至參粒溫陳米飲下不拘  
時候如藥收多時堅硬即於火上烘動圓之  
皂香圓磨積快脾氣

五靈脂

別研

巴豆

去油別研

丁香

不見火

沈香

不見火

安息香

壹錢別研

肉豆蔻

別研

青皮

去穰合肆兩

杏仁

去皮尖各捌拾壹粒

木香

不見火

胡椒

各壹分

檳榔

貳兩

乾薑

炮洗各壹兩

右為細末、水煮麪糊為圓、如梧桐子大、每服貳圓、薑湯任下、血氣、菖蒲湯下、

丁香內化圓、治食積腹痛、兼治冷痢、

巴豆

壹兩、去殼、鐵穿、烏梅貳兩、燈焰上燒存性、

丁香

參兩、不見火、

縮砂

肆兩、去皮、

胡椒

伍兩、

右為細末、用陳米飯攪和、杵仟餘下、圓如小梧桐子大、每服柒粒、溫水下、不拘時候、

眼目

清明丹、明目、補肝、清膽、還元、固本、退翳、瘴黑、花、賭、

物茫茫之疾、升降上熱下冷、有奇功、

好猪肝

壹具、先用竹刀好

醋浸半日、盡去瘀血、切作片、所令極細、

木賊草

炒

川羌活

者、節

蒼朮

米泔水浸壹宿再炒

當歸

去蘆酒浸

遠志

去心

甘菊花

各壹兩半

荆芥穗

枸杞子

去蒂酒浸

川烏頭

炮去皮臍

防風

去蘆

車前子

炒

旋復花

去枝

地膚子

炒

白芷

黃芩

玄參

人參去蘆

雄小黑豆炒去殼各壹兩

川芎

麥門冬貳兩半去心

蟬退去土收者

薺菜子春收者各半兩

右為細末、用前猪肝為圓、如彈子大、如肝少入蜜、每服壹圓、食後荆芥茶湯下、

八味圓、補肝腎、明眼目、

牛膝去蘆酒浸壹宿

當歸去蘆酒浸壹宿

海螵蛸炙去殼

白茯苓壹兩貳錢去皮

甘草貳兩各

苦胡麻仁

草決明子炒

右為細末、用前猪肝為圓、如彈子大、如肝少入

兔絲子

洗淨酒浸麥地

蛇骨皮

去土

遠志

湯心

研成餅

石菖蒲

去毛

綿黃耆

炙

熟乾地黃

去土

右等分爲細末

酒煮山藥糊爲圓

如梧桐子大

每服伍拾圓空心鹽湯送下

兔絲子圓

治眼暴赤退腫除冷淚出痛

兔絲子

洗淨酒浸

車前子

微炒

香白芷

細辛

各壹兩

人參

半兩

麝香

別研

右爲細末煉蜜爲圓如梧桐子大每服參拾圓



不拘時候、日進參服、

夜光圓、治男子肝腎風虛、目多昏痛、時有黑花、當風有泪、羞明怕日、翳膜障遮、視物不明、久服補肝明目、髮白再黑、強志爽神、此藥神效、不可盡述、

菊花

熟乾地黄

各壹斤肆兩

川椒

壹拾貳兩去目微炒

右為細末、煉蜜為圓、如梧桐子大、每服參拾圓、空心日午鹽湯下、忌食動風等物、

還睛圓

川芎

荆芥

防風蘆去

白茯苓皮去

青箱子土去

白朮炒

兔絲子淘去土酒浸

蔓荊子土去

羌活蘆去

覆盆子去

右等分爲細末煉蜜爲圓如梧桐子大每服參  
拾圓食後麥門冬湯下

生地黃煎補肝明目

生地黃洗淨

枸杞子去

五味子去

右等分不犯銅鐵器搗爲細末煉蜜圓如梧桐

子大每服柒拾圓食前鹽酒鹽湯米飲仕下  
菊花散治男子婦人風毒氣毒翳膜遮障羞明怕  
日倒睫多淚緣眶赤爛及治婦人血風攻症及暴  
赤眼腫痛但是一切眼疾及小兒膚瘡熱毒入眼  
生翳膜

菊花

壹斤拾貳  
兩去搜

荊芥穗

旋復花

拾肆兩  
去搜各壹

甘草

肆兩  
炙

決明子

炒

木賊

蒼朮

各壹拾壹兩  
浸壹宿去麋  
脫皮炒

狗忌子

陸兩

右爲細末、每服壹錢半、清米泔水或薄苛蜜湯調下、食後服之、治目疾不能視物

歲靈僊

僊靈脾

分各等

右爲細末、茶調下、食後服、

治兩目清盲、

腦月黃牛膽、入黑豆不拘多少、須揀拾分圓者、經壹佰日、取出豆、去膽不用、每服豆肆拾玖粒、食後白湯嚥下、

七奇湯、洗眼目、婦人患眼、可煎服、却用滓再煎湯、

洗之

生乾地黄 洗

白芍藥

甘草

桑皮 各參錢  
短生用

右爲麤末每服患重者伍錢輕者參錢水柒分  
椀煎至半椀先熏眼候溫去滓洗再溫再洗日  
伍柒次別換

三神湯治肝腎俱虛虛熱上衝眼目隱澀或生翳  
膜侵睛迎風有泪視遠無力及眼暴赤腫目暗痰

川芎

當歸 洗各壹兩  
短生用

鷹爪黃連

痛熱泪如湯者、宜用之、

川黃連

去鬚  
壹兩

川當歸

去蘆洗  
淨半兩

杏仁

去皮尖壹分  
並不見火

右㕮咀、每用參錢以軟淨生絹片包、線繫定、銀  
盞盛水半盞、重湯煮、令水減參分之壹、候冷、時  
時以藥包蘸藥汁洗眼、入眼中、漸漸化翳膜、成  
淚消去、每次煎可用參伍日、每用畢、須以淨物  
密蓋、勿為塵垢入藥、

治眼赤疼

秦皮

甘草

黃相<sub>栢</sub>皮

黃連

右等分爲麤末入砂糖壹塊如彈子大用水貳  
梳煎至壹梳去滓乘熱洗眼候冷再煎再濾洗  
之如此可用伍度奇妙

聖效散洗眼

爐甘石壹兩  
火煨

黃連兩半

海螵蛸肆兩  
水浸柒  
日每日換水

青鹽別研

白礬枯

號丹水飛

輕粉各壹兩

右研極細末每用壹字湯泡洗眼點亦得

治暴赤眼

宣連

參兩  
去鬚

砂糖

貳拾  
文

當歸

去  
蘆

赤芍藥

各貳  
兩

右為細末，綿裹藥伍錢入水壹盞半，蒸頓令濃，別用小綿毬蘸洗赤處，候口苦為度，少時再頓，令熱如前法洗之。

治赤眼

銅青

拾伍  
文

地龍

拾  
文

右用水兩碗煎至壹碗，白器內澄清，每用半盞，溫過洗之，又眼赤則用消風散搐鼻，左搐左鼻。



右搗右鼻

又方

用好乾薑湯浸洗之奇効  
治爛眶風眼

銅青

白堊

右等分細研每用壹錢許衣湯泡澄取清汁洗  
每服可洗參次

羗活膏

羗活

芙蓉葉

黑豆

麴

黃皮根子

右等分爲細末、生水調、用青皂紗貼之、

金線膏、治風毒氣赤眼、壹兩日見效、及翳膜遮障、

紅赤瘀肉、壹月日洗下、

黃丹

貳兩、用銀銚炒、紫色、

朴硝

兩、研

白砂蜜

肆兩、與炒了黃丹壹處、於銀石器內熬熟、壹傾、其滓再熬、

重濾去汁、其滓再熬、

右每用壹皂子大、於淨器中熱湯化開、先將藥

熏眼、候湯溫洗眼、拾餘遍了、便睡、藥且留用參

伍次功效不可具述

點眼方

黃連

貳兩  
極細研

黃丹

壹錢  
極細研

蜜

柒兩

右用銀盃盛在重湯中、以文武火同煎成膏、筋挑放水中點成珠方取出、候溫將蜜絹兩重濾過用、或點或泡湯熏洗、如眼昏澀障翳亦可去、

又方

用黃連當歸各半兩、溫水壹貳次洗去泥、令極淨、然後用銅刀切片、竹刀亦得、以水壹大掬銀

銅器內煎，如水乾，未濃，再添少水，覺汁濃，去滓，只將汁再熬成膏，每用銅筋點眼，點時須仰面，令人點覺，口中有苦味，方是藥透，却以鹽湯漱口，此藥退赤脉，日日點之，久而目明睛黑，方知効驗。

玉龍膏治諸風毒，眼赤澀眵，淚隱痛，或生瘰癧，翳膜，悉皆治之。

麝仁

肆拾箇  
去皮

杏仁

柒箇  
去皮尖

以上貳味同研如膏，攤在磁碗內，用熟艾如雞子大，燒煙熏，令如粟米色。

取下細研

鵬砂透明者

牙硝黑豆大

腦麝各少許

滴乳香黑豆大

輕粉壹大錢

右同研入白蜜少許研為膏用瓷合盛每點半

粟米許

輪雪治暴赤眼腫脹疼痛不可忍者壹點立效

朴硝壹兩用熱湯泡開用皮紙濾過在建盞內火上煨水乾括出朴硝入腦子少許研細尾器藏之每用壹茶豆許點之

治障眼

虎骨

貳錢半

孕婦甲

拾枚乾

右爲細末點之如見物則不用再點  
治爛弦風眼

覆盆子

右件取葉按碎以汁滴眼中卽有蟲出  
治赤眼

用蘿蔔如鴨子大去中肉却用黃連壹拾文爲  
麤末用取下蘿蔔肉再入蘿蔔內以濕紙裹之  
灰火煨熟去紙取汁點眼極妙

治眼白赤

鬱金

焰硝

右各少許、研細、搐鼻中、熱淚出即愈、

耳疾

穿珠圓、治上壅耳聾、

石菖蒲

節密者去毛半兩

麝香

錢半

右爲細末、鎔黃蠟半兩和爲塊、每用小石蓮大

中間以大鍼穿竅、夜間安兩耳內、日間取去、

紅綿散、治聾耳出膿奇效、

白礬

不拘多少枯

右每用壹錢、入胭脂壹字、麝香少許、再同研和、先以小杖子、綿纏線、去耳內膿水盡、別用綿杖引藥入耳、或用葱管吹入亦可、如壯盛人積熱上攻耳、出膿水不能瘡者、用涼藥瀉之、卽愈、

### 治耳聾

用綿裹甘遂塞耳中、便嚼甘草、少時拔去甘遂、氣自通快、蓋甘遂甘草相反故也、切不可貳物同嚼之、

### 治耳聾多年不聽者、

浮石不以多少、火煨通紅、取出、用紙壹張盛藥、



於地上出火毒壹伏時、研細、每服貳錢、米飲下、  
食後日參服、近年者拾餘日漸聽、遠年深者月  
餘見效、

### 治耳鳴

生川烏頭尖

雄黃

右爲細末、用綿裹塞耳內、

### 又方

葱管入地龍末塞耳內、

### 治聾

不問年深、相近、取小鼠膽、令人側卧、瀝膽入耳、

中須臾膽汁透下、初益龍耳、半日方可、雖參拾年  
者亦差、

牙齒

異香丹治勞心思慮過度、胃中客熱上攻、口氣齒  
衄、時時血出、牙齒浮動、或疼痛不能咀嚼、飲食、竝  
宜服之、

白芷

零零香葉

桂花

不見火

甘松

淨洗

藿香葉

新者淨洗

木香

不見火

香附子

去毛淨洗

丁香

不見火

雞心檳榔

白豆蔻仁各壹兩

榆柑乾參錢

當歸

去蘆洗淨酒浸壹宿焙乾用半錢淨

右爲細末用甘草膏子爲圓如小雞頭大每服壹粒含化柒日後口有異香面色光澤久服身體皆香行步輕健

又方

甘草不拘多少炙黃礱爲細末煉蜜爲圓如雞頭大每服壹粒含化

紅娘圓治艸牙

淨智莊大師傳

紅娘子

福馨

桂

全蠍

真石灰

右等分、先將餅藥於盞內火上煎候微沸、即投石灰、次投諸藥末、攪圓微乾、看蚰花大小、圓以綿包安患處、

香烏圓治風蛙牙疼不可忍者、

透明乳香

川烏頭尖

右等分、滴水爲圓、如梧桐子大、安在蛙牙齦子內、噤定、須是食頃、涎多吐出、溫水嗽口、如無涎子、旋用藥末擦傅牙縫、噤定、食頃、涎多吐出、溫

水漱口、如此用藥、分兩次、即愈、

枯痛圓、治蛀孔、

龍骨

乳香

血竭

生附子尖

蠟梢

分各等

右研細末、水圓成塊、塞蛀孔中、

鶴膝湯治牙疼、

鼓椎草

又名鶴膝草

右件煎湯灌漱、即妙、

蒼耳湯

蒼耳根

右件濃煎湯熱漱壹碗以下復定或用五積散入麝香少許同煎服亦可

升麻細辛湯治風牙疼

升麻

荆芥穗

防風

去蘆各半兩

細辛

壹兩去上

右為麤末每服肆錢水壹盞半煎至壹盞去滓

熱服漱令冷吐之為細末揩齒良久吐出溫鹽湯漱之亦得

竹葉湯治齒衄

苦竹葉

右不拘多少、濃煎湯漱之、

大牢牙散、治齒痛及血出齒疎、肉爛惡氣、齒脫用藥再生、疎者則密、有蟲則消、兼通腎氣、亦治纏喉風、小兒走馬疳、

白礬

枯

百藥煎

炒

乾薑

洗地

革撥

各壹兩

草烏頭

炒

川烏頭

炒

地骨皮

縮砂

各半兩

右為細末、每服用楷牙、少頃溫水或鹽湯漱口、

忌酸鮓醬、每日食後及早晚使、尤妙、  
堅牙散、治一切風牙、疳牙、小兒亦可用、

升麻

露蜂房 炙

細辛

高良薑

猪牙皂角

草烏頭 炮

香白芷

木律

炒 各  
壹兩

萆撥

胡椒

各 貳  
兩

半夏

半兩湯  
泡 柒次

右爲細末、每用半錢、手點揩牙、溫湯漱、如痛多  
者、用薑錢點揩、



失笑散治牙疼

華撥

地龍去土

天南星

川烏頭

胡椒

右等分爲細末、先用刷牙灌漱牙淨、用藥乾傳  
痛處隨手見效

立應散大治齒痛

草烏頭壹箇揀光淨極大者去皮臍生用

香白芷

壹兩

右爲細末、每日兩次擦、如有熱涎吐之、少時用

溫水漱痛自定

玉池散治風虫牙疼痛痒宣露動搖血出煩悶口  
氣每服以手揩牙腫處良久漱嚥無妨如大段爲  
搜者亦可用

地骨皮

香白芷

川升麻

防風

細辛

槐花

川芎

當歸

藁本

甘草

右等分爲細末每服參大錢水貳盞入黑豆半

合生薑參片同煎至壹盞半和淨鹽宜漱之  
青鹽散治牙齒疼痛時時浮動

蠟梢

胡椒

各壹錢

乾薑

錢貳

青鹽

壹錢別研

右為細末入磁合內旋旋搥搭齒間良久鹽湯漱之

全蠍散治牙疼甚妙壯盛人方可用之

傳惠齋

腦子

血竭

南鵬砂

乳香

全蠍

右等分爲細末搯之

香芥散治風牙疼不可忍者

荊芥穗

香附子去毛

右等分爲麤末每服伍錢水壹碗煎至半碗去

滓頻頻嗽之

炙皂散治風牙疼

不虫皂角壹斤 去皮

生地黄貳斤 取汁

生薑貳斤 去皮 取自然汁

右以皂角蘸汁慢火炙盡爲度每日早晨以牙

刷刷皂角濃汁出搯牙旬日後更無一切齒疾

養源散

熟乾地黄  
麥兩

破故紙  
貳兩

青鹽  
壹兩 別研

右先將地黃炒令焦次入破故紙同炒令爆聲  
定却入青鹽同炒碾為細末臨睡搭牙早辰用

亦得

烏石散

草烏頭

升麻  
各拾

寒水石

拾文 煨通紅

細辛  
拾伍

蔓荊子

伍文

右爲細末、揩牙、少時以溫鹽湯漱之、  
薑黃散治牙痛不可忍者、

薑黃

細辛

白芷

右等分爲細末、併擦兩齦、次鹽湯漱之、立効、政  
和八年、胡長文給事之父、牙疼不可忍、面腫、偶  
無薑黃、檢本草云、川芎亦治牙疼、遂以代之、坐  
間、便見腫消痛止、後用川芎代之亦驗、  
香椒散治牙疼、

草烏頭

生去皮、  
取白者用

胡椒

乳香

研別

蠟梢

毒不

右等分爲細末每用少許擦牙疼處吐出頑涎

立止

內補散補腎去風牢牙定疼

皂角

不蛀者刮去皮子以炭

火燒爲灰略存性壹兩

去稷葉

青鹽

炒乾

北細辛

去壹錢

香附子

炒去毛用麝

皮洗淨貳兩

舶上茴香

炒貳錢

右爲細末和調以密器收貯每用揩牙

五倍子散口齒疳蟲匿

五倍子

分參

黃丹

分壹

右為細末、以綿裹貼斷上塗之亦得、日可用參  
伍次、

黃蘗散、口臭、蟲蝕作孔、

黃蘗

壹兩  
微炒

青黛

兩半

麝香

壹錢  
別研

右為細末、每取少許、摻貼疼處、壹日上參肆次、  
殊聖散、治牙疼、

白礬

膽礬

右等分、研細末、飛過、入麝香擦牙、



臘脂散治牙疼

百藥煎

坯子

右等分爲細末擦牙津吐之

芫花散治牙痛諸藥不効者

芫花碾爲末擦痛處令熱立効

赤荆散治牙宣

赤土荆芥同爲細末揩齒上以荆芥湯漱之

燒茄散

用糟茄切片新瓦上烘金乾黑色爲末傳之

治牙疼

細辛

麻黃

前胡

右等分爲細末、以米醋同煎、灌漱立効、

治風艸牙疼

獨活洗淨切片、濃煎熱漱、冷吐之、

治風牙腫痛

巴豆壹粒、切開作兩邊、入麝香乳香、各少許、  
摻在巴豆中、捻合用線繫定、如左邊痛、以右邊  
巴豆塞之、右邊痛、以左邊巴豆塞之、以涎出盡  
爲度、

又方

生薑

升麻

川地黃

旱蓮

木律

荷蒂

青鹽

猪牙皂角

槐角

細辛

右等分、壹處入在甕合內、鹽泥固濟、煨成炭、取出爲末、先漱灌後揩擦、嚙之亦無害、其驗不可具述、

發背癰疽

猪蹄湯洗瘡屢效

猪蹄

壹隻洗淨用水參研煮令拾分爛熟去蹄取清汁用入後藥

黃耆

黃連

赤芍藥兩參

黃芩

狼牙根

薔薇根各貳兩

右剉碎用猪蹄汁煎約乾參分之壹過滓以汁分作參次用筆洗瘡去惡肉甚快用膏藥傳之加減香連湯治諸般癰疽發背已破未潰惡證並皆治療

木香

不見火

沉香

不見火

檀香下見

雞舌香研別

赤芍藥

桑寄生

升麻

大黃

乳香研別

藿香上

連翹

當歸去

黃蓍蜜炙

右等分爲細末、酒水合和同煎服、視病輕重加減、大黃同煎、

立效、木香散治諸般惡毒、發背癰疽已破未潰者、並皆治之、

生乾地黄

洗

麥門冬

心去

羌活

白芷

肉桂

不見火  
去麝皮

當歸

去蘆

桔梗

連翹

木香

不見火

升麻

芍藥

川芎

木通

去皮

黃芪

炙蜜

甘草

炙

右等分、為細末、溫酒調服、初用而患人大便未  
曾泄、即多加大黃服之、如以水合酒煎之尤佳、

若以十全內補散加木香以酒水煎之亦有大  
效緩急以十全內補散搜雲母膏貳兩或壹兩  
爲圓仍以木香酒調內補散任下  
破膿如神散應未潰者服之即潰

老紫皂角鐵煅炒令黃色

當歸去蘆

赤芍藥

川芎

火不見

右等分爲細末每服貳錢入乳香少許酒壹大  
盞煎壹貳沸服之不潰再服

大托裏散

菜豆

甘草

各半兩炙

大括葉壹箇取

乳香貳錢別研

沒藥參錢別研

右為細末用無灰酒參勝熬壹勝頓服毒未消

再服

黃芩散治癰疽大小便不通

麥門冬去心

大黃

赤茯苓去皮

木通去皮

甘草各半兩炙

燈心壹箇

右咬咀每服參錢水壹大盞煎至捌分去滓空

心溫服



又方、治癰疽發背未成即散已成即潰

日疼可用銀星草 夜疼即用金銀花驚也

日夜俱疼全不止 貳方等分勿令差

右咬咀水酒煎服

清涼膏治初腫發未成膿者貼之即散有膿者已破而尚腫亦可用之

木鼈子去殼

黃蘗

敗荷葉

黃芩

芙蓉葉

黃連

草烏頭

朴硝別研

菰藥

玄參

右等分爲細末用薑汁調成膏傳上如熱甚卽以水并蜜調傳外以紗片掩其上乾卽再換多傳尤佳如痛甚卽加乳香沒藥如有絲瓜取自然汁調傳之亦妙

搗毒膏

生乾地黄

玄參

狗忌子

大黃

木鼈子

白芷

赤芍藥

當歸

桑白皮

肉桂

猪牙皂角

連翹

白歛

升麻

防風

桔梗

柳枝

桃枝

槐枝

桑枝

乳香

沒藥

黃丹

男子髮

右用麻油浸沒過半寸許春秋伍日早夏參日冬

柒日和藥壹處入髮煎用慢火熬候白芷色黑

斤半

先貳兩淨

並各壹兩半研

各壹兩

髮脆斷、卽漚去衆藥、再煎、以柳枝不住手攪之、  
約兩箇時辰許、其油覺稠粘、卽取起、令溫、却入  
黃丹攪均、再煎、令沸、又挈起、凡參伍次、方定、又  
煎、試以壹貳滴滴水中、不散、卽入乳香、沒藥、再  
煎、仍試滴水中、成珠子、卽入瓶收、覆地上出火、  
毒貳宿、

生肌藥、生新肉、去惡肉、膿毒漸令口合、

石膏

煨

號丹

當歸

去蘆各壹兩或錢

乳香

半兩別研

右爲細末、用麻油調塞瘡口、仍於外以搗毒膏

貼之壹日壹換

收瘡口藥

五倍子 燒

桑白皮

紫藤香

黃丹 檳榔

木香 下見

訶子 去核

右等分爲細末乾摻如瘡乾卽以麻油調傅之

三羊散治內外腫瘡及諸般惡瘡

三月羊糞 入瓶內鹽泥固濟煨存性爲末

膩粉

右等分、拌和、先以溫水淨洗瘡、去皮、用壹匙搽放瘡上、

治軟癰

用久使銀鍋底墨礮爲細末水調塗之或鷄子

抵聖散治癰瘰

雄鵓鵲

糞

好肆  
小兩

蚌撻

爆緊

音 韻

是昔

南木香

見壹

火兩  
下

臟

茶

斯威

百 四

右爲細末、每服貳錢、食後茶清調、

白飲散傳瘡長肉生肌

新貳  
看兩

白欵

遠志

梨蘆壹分

白芷壹兩

右為細末以臘月猪脂調傅之

梨蘆粉治諸般癬瘡

梨蘆

斑猫拾枚去頭足翅

右為細末以清油調和候癬痒發先以布搭

動次用藥塗之

白礬研引

雄黃各半兩別研

麝香壹錢別研

硫黃各半錢別研

膩粉壹錢

癬痒發先以布搭

鹿香散治下脛瘡

鹿角燒灰入麝香少許乾摻神效

六物散

五倍子

半兩燒

黃蘗

當歸

去蘆炒

膩粉

白礬

枯別研

漏蘆

各半錢

右研令極細以鹽水洗瘡拭乾傳之

積熱喉閉舌腫口瘡

甘草圓治口乾舌澀

人參

去蘆

甘草炙



烏梅

微炒各壹兩

生乾地黄

貳兩

右為細末、以棗肉同煉蜜和、杵參貳佰杵、圓如彈子大、綿裏含化、

神巴圓治喉閉、

巴豆

貳粒去殼

烏梅肉

壹箇白梅亦得

右和圓如棗豆大、每服參粒、置口中、立効、如牙

關閉者、用少許揩牙即開、

清膈圓治膈上壅熱、舌焦口瘡、驅風涼血、

當歸

去蘆

防風

去蘆

羌活

各壹兩

大黃

乾葛

川芎 各半兩

荆芥

薄荷葉 各壹分

甘草 參分

白芍藥 壹兩半

右為細末用糕糊為圓如大雞頭大每服壹貳圓食後臨卧細嚼嚥下能飲酒人醉後臨睡化

壹圓甚妙

瀉心湯

人參 去蘆

黃連

乾薑 洗地炮

黃芩

甘草 炙

右等分為細末每服參錢水壹盞半生薑拾片

煎至米分去滓溫服

玉礬湯治喉閉不通水穀

白礬研化以竹筒盛猛灌之

馬嘶湯治喉閉深腫連頰吐氣名馬嘶閉

馬嘶鐵壹具水參盞煎至壹盞溫服

吹喉散治大人小兒喉閉腫塞不下水漿須臾不

療宜用此方

鵬砂

龍腦

青黛各壹錢

馬牙消

白礬

生膽礬

各壹錢半

硝石

參錢

白僵蠶

或拾壹枚別研

右各研細拌和每用筆管抄少許吹在咽喉內

立效

碧雲散治喉閉

明淨白礬為末壹錢尾上鎔成汁入已豆去殼

壹粒在礬內候礬乾為度細研分為肆服每服

壹字以竹管吹入咽中以涎出為效壹方用青礬

回生散治諸般喉閉危急之疾

土醫師傳

鴨嘴膽礬

草烏頭

不去皮

右等分爲細末、和調、過喉閉、吞嚥不下、以蘆管  
吹壹字、入鼻中、先含水壹口、藥入咽中、卽時涎  
出、若覺涎少、復用川大黃、參朮、如散子、大水壹  
盞煎至柒分、入朴硝壹錢、再煎壹沸、令溫服、搖  
鼻了、咽喉卽開、吞嚥無阻、纔得利、後病如失去、  
神効不可具述、

立應散治咽喉腫痛、語聲不出者、

大鵬砂銖等

右研細、用筆管吹入喉中、

追涎散治喉閉、

石綠臘茶等分分用薄苛酒調下嚥入喉中吐涎  
即止

白蠶蠶散治纏喉風并急喉閉喉腫痛者

白蠶蠶真好白色者壹兩新瓦

天南星白者壹兩炮裂

右為細末每服壹字用生薑自然汁少許調藥  
末以熱水投之呷下吐出涎痰即快不時服之

壹方只用

白蠶蠶

又方

白蠶蠶半錢為細末薑汁調服之如自服不得

灌下、若痰涎壅塞不能吐却下蘇沈良方內一字散以薄荷揉碎拍藥搯牙及咽喉取痰涎青礬散治喉閉

白殭蠶

白礬

銅綠

螺青亦得各半兩

甘草

壹錢炙

右件同於鐵鉏內煎令白礬枯每服壹錢生薑汁調下涎出立愈如口不開卽灌之

硝石散

硝石

蒲黃

青黛

甘草  
炙

右等分爲細末乾摻口中津嚥下

開咽喉捷法速効方

巴豆壹粒去殼微煨以紙熱捲令緊中心切斷  
隨所患安在右鼻中衝破卽去之

寬咽喉治喉閉遂巡不救

酒壹盞皂角半條就酒揉按濃汁出急煎壹沸  
淘溫與服立便衝破吐出水及痰血此方經驗  
極妙如口噤吞嚥不得卽以麻油按揉皂角

灌

酒煮礬治喉閉咽喉腫痛



白礬

明瓦兩或拾兩

右為細末、砂石器內以無灰酒煮至紫黑色為

度、入砂合內收與面油膏相似、每用半匙許、含

化、候取出痰即消、此藥煮時須慢火煎熬、熟時

須攪稀放冷、如稍健硬即又添酒煮、直至紫色

為度

玉筋硝治喉閉

硝砂

少許

馬牙硝

壹分

黃丹

伍錢

白礬

皂子大

硝石

肆兩為

巴豆

陸甲為

蛇蛻壹條全首  
爲末搗碎

右用鑊鍋子依次第逐旋下藥下到巳三時須  
逐箇咬破下候火蝴蝶盡方再下壹箇如此陸  
次然後旋下蛇蛻方成候冷罐子自破藥作塊  
每用壹字以竹筒子吹入喉中如些小咽喉不  
利只含化少許合時忌鷄犬婦人見